

Informations sur les Médicaments



Abacavir (ABC, Ziagen)

Pourquoi l'abacavir dans le cadre de mes médicaments?

- L'abacavir (également appelé Ziagen) est un médicament qui s'utilise en association avec d'autres médicaments destinés à traiter l'infection par le VIH (virus d'immunodéficience humaine).
- L'abacavir a pour effet de bloquer une protéine appelée «transcriptase inverse» et, en raison de cette propriété, il appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la transcriptase inverse (ITI). Le VIH a besoin de cette protéine pour se reproduire et, donc en bloquant cette protéine, le médicament contribue à ralentir l'évolution de la maladie causée par le VIH.
- L'abacavir entre également dans la composition du médicament anti-VIH, Trizivir.
- Ce médicament peut réduire la quantité de virus présent votre corps. Il peut aussi réduire vos risques de souffrir de l'une des maladies liées au sida, vous aider à rester en santé plus longtemps ou rétablir votre santé. Il peut aussi réduire les dommages causés à votre système immunitaire.

Comment prendre ce médicament?

- L'abacavir se présente sous forme de comprimés de 300 mg et de liquide (20 mg/c.c.). La dose habituelle de l'abacavir est de 300 mg deux fois par jour. L'abacavir se prend avec ou sans nourriture.



Canadian AIDS Treatment
Information Exchange
Réseau canadien
d'info-traitements sida

www.catie.ca



www.apaa.ca

Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un professionnel ou une professionnelle de santé qualifié(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et des traitements en question.

Abacavir (Ziagen)

- L'abacavir doit être conservée à température ambiante, dans un endroit sec. Éviter de ranger le médicament dans la salle de bain ou la cuisine, car l'humidité présente à ces endroits risque d'entraîner une perte d'efficacité du médicament.
- Gardez ce médicament hors de la portée des enfants.

Que faire si j'oublie une dose?

- Prenez la dose que vous avez oubliée dès que vous vous en apercevez. Toutefois, si vous vous en rendez compte moins de 2 heures avant la prise de votre prochaine dose, attendez pour reprendre votre horaire habituel. Ne doublez pas la dose.
- Selon de récentes études, pour que les médicaments anti-VIH soient efficaces, il faut les prendre avec régularité et assiduité. Le fait d'oublier ou de sauter une dose de ces médicaments les rend moins efficaces, et cela permet au virus de se transformer et d'acquérir une résistance à ces médicaments.

Quels sont les effets secondaires de l'abacavir?

- L'effet secondaire le plus grave de l'abacavir est une réaction d'hypersensibilité qui se manifeste par des symptômes d'une maladie semblable à la grippe. Cette réaction se produit chez environ 3 % des gens qui prennent abacavir et elle peut être mortelle. Parmi ces symptômes possibles, mentionnons les suivants : fièvre et frissons, douleurs musculaire et articulaire, fatigue et état d'épuisement, nausées et vomissements, éruptions cutanées ou essoufflement. Si vous éprouvez deux de ces symptômes ou plus, communiquez immédiatement avec votre médecin. N'arrêtez pas de prendre ce médicament avant d'en avoir parlé à un membre de votre équipe soignante.
- Les autres effets secondaires fréquents de l'abacavir peuvent comprendre les suivants:
 - éruptions cutanées
 - fatigue
 - maux de tête



Abacavir (Ziagen)

- insomnie
 - diarrhée
 - nausées
 - vomissements
 - douleur musculaire
- Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous éprouvez ces effets secondaires.

Puis-je prendre l'abacavir avec d'autres médicaments?

- L'abacavir peut entrer en interaction avec d'autres médicaments. Assurez-vous d'avoir mentionné à votre médecin et à votre pharmacien tous les médicaments disponibles sur et sans ordonnance (y compris les vitamines et remèdes à base d'herbes médicinales) que vous prenez.
- Les médicaments qui peuvent entrer en interaction avec l'abacavir incluent les suivants : Antabuse, Parafon Forte, le chloral hydraté (ou hydrate de chloral) et l'isoniazid. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre l'un ou l'autre de ces médicaments.

Puis-je consommer alcool ou drogues de la rue durant mon traitement avec l'abacavir?

- Évitez l'alcool si vous prenez de l'abacavir. L'alcool peut augmenter le taux de l'abacavir et en intensifier les effets secondaires.
- L'abacavir peut également entrer en interaction avec les drogues de la rue. Par conséquent, si vous faites usage de tels drogues, consultez votre médecin et votre pharmacien qui pourront vous conseiller sur les précautions nécessaires.

Puis-je prendre de l'abacavir si je suis enceinte ou si j'allaité?

- Si vous êtes enceinte et si vous souhaitez prendre de l'abacavir, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Étant donné que le VIH peut se transmettre par le lait maternel, il est recommandé aux femmes séropositives à l'égard du VIH de ne pas allaiter.



De quelles autres précautions devrais-je être conscient durant mon traitement par l'abacavir?

- Respectez les rendez-vous que votre médecin a prévus pour les analyses sanguines dans le cadre de son suivi régulier de vos fonctions hépatique et rénale.
- Assurez-vous d'avoir sous la main une réserve constante de votre médicament.
- L'abacavir ne détruit pas le VIH, ni n'est une cure pour le sida. Il ne prévient pas non plus la transmission du VIH. Par conséquent, n'oubliez pas de prendre les précautions qui s'imposent avant les contacts sexuels (utilisez des condoms en latex) ou l'injection de drogues (utilisez des seringues propres).

Déni de responsabilité : Le Réseau canadien d'info-traitements sida (CATIE) et Africains en partenariat contre le sida (APAA) fournissent, de bonne foi, des ressources d'information aux personnes vivant avec le VIH/sida qui, en collaboration avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou diffusés par CATIE et APAA ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils médicaux. Nous ne recommandons ni appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos clients à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos clients à consulter un professionnel ou une professionnelle de santé qualifiée avant de prendre toute décision d'ordre médical ou d'utiliser un traitement, quel qu'il soit.

Nous ne pouvons garantir l'exactitude ou l'intégralité des renseignements publiés ou diffusés par CATIE ou APAA, ni de ceux auxquels CATIE ou APAA permet l'accès. Toute personne mettant en application ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE, ni APAA, ni Santé Canada — ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles — n'assume aucune responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l'usage de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent document ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE ou APAA, ou auquel CATIE ou APAA permet l'accès, sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels de Santé Canada

Droit d'auteur: Cette information a été rendue possible grâce à une collaboration entre - Africains en partenariat contre le sida (APAA), Asian Community AIDS Services (ACAS) et le Réseau canadien d'info-traitements sida (CATIE). Le texte original a été développé par ACAS en 2001. Le texte a été traduit en 2004 par APAA en swahili et haoussa.

Cette information est aussi disponible en chinois, en tagalog et en vietnamien



Financé par le Programme des soins Santé Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le VIH/sida



Financé grâce à une subvention éducative sans restrictions de



partenaire
in partnership with

