

Informations sur les Médicaments



Saquinavir (Invirase, Fortovase)

Pourquoi le saquinavir dans le cadre de mes médicaments?

- Le saquinavir (Invirase ou Fortovase) est un médicament qui s'utilise en association avec d'autres médicaments destinés à traiter l'infection par le VIH (virus d'immunodéficience humaine).
- Le saquinavir a pour effet de bloquer une protéine appelée « protéase », et ainsi, il appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la protéase (IP). Le VIH a besoin de cette protéine pour se reproduire, et donc, en bloquant cette protéine, le médicament contribue à ralentir l'évolution de la maladie causée par le VIH.
- Ce médicament peut réduire la quantité de virus présent votre corps. Il peut aussi réduire vos risques de développer l'une des maladies liées au sida, vous aider à rester en santé plus longtemps ou rétablir votre santé. Il peut aussi réduire les dommages causés à votre système immunitaire.

Comment prendre ce médicament?

- Le saquinavir se présente sous 2 formes différentes: Invirase, sous la forme d'une capsule verte et jaune de 200 mg; et Fortovase, sous la forme d'une capsule molle (ou gélule) beige de 200 mg
- Le nombre de capsules que vous devez prendre dépend de la forme du médicament qui vous a été prescrit. Dans les deux cas, Invirase et Fortovase se prennent avec de la nourriture ou dans les deux heures qui suivent un repas.



Canadian AIDS Treatment
Information Exchange
Réseau canadien
d'info-traitements sida

www.catie.ca



www.apaa.ca

Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un professionnel ou une professionnelle de santé qualifié(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et des traitements en question.

Saquinavir (Invirase, Fortovase)

- Avaler les capsules entières, sans les mâcher ou les écraser.
- De nos jours, le saquinavir s'utilise principalement en association avec un autre inhibiteur de la protéase, tel le ritonavir (Norvir).
- Ne rangez surtout pas ce médicament dans la salle de bains ou la cuisine, car l'humidité présente à ces endroits risque d'entraîner une perte d'efficacité du médicament.
- Les capsules Invirase doit être conservées à température ambiante, dans un endroit sec.
- Les capsules Fortovase peuvent se conserver à température ambiante pendant un maximum de 3 mois.
- Gardez ce médicament hors de la portée des enfants.

Que faire si j'oublie une dose?

- Prenez la dose que vous avez oubliée dès que vous vous en apercevez. Toutefois, si vous vous en rendez compte moins de 2 heures avant la prise de votre prochaine dose, attendez pour reprendre votre horaire habituel. Ne doublez pas la dose.
- Selon de récentes études, pour que les médicaments anti-VIH soient efficaces, il faut les prendre avec régularité et assiduité. Le fait d'oublier ou de sauter une dose de ces médicaments les rend moins efficaces, et cela permet au virus de se transformer et d'acquérir une résistance à ces médicaments.

Quels sont les effets secondaires du saquinavir?

- Les effets secondaires les plus fréquents du saquinavir peuvent comprendre les suivants:
 - dérangements d'estomac et nausées
 - gaz et diarrhée
 - éruptions cutanées (rash)
 - maux de tête
 - fatigue
- Les effets indésirables à plus long terme du saquinavir peuvent comprendre les suivants:



Saquinavir (Invirase, Fortovase)

- une augmentation des taux sanguins de sucre (glycémie) et de lipides (matières grasses telles que cholestérol, triglycérides)
- une distribution anormale des graisses corporelles (augmentation de la taille et des seins, et amincissement du visage, des bras et des jambes)

Si vous éprouvez de tels effets secondaires, consultez votre médecin ou votre pharmacien. N'arrêtez pas de prendre le médicament et n'en changez pas la dose sans en parler d'abord avec ces derniers.

Puis-je prendre le saquinavir avec d'autres médicaments?

- Le saquinavir peut entrer en interaction avec d'autres médicaments. Assurez-vous d'avoir mentionné à votre médecin et à votre pharmacien tous les médicaments disponibles sur et sans ordonnance (y compris les vitamines et remèdes à base d'herbes médicinales) que vous prenez.
- Le saquinavir ne devrait pas se prendre conjointement avec:
 - Hismanal (astémizole)
 - Seldane (terfénadine)
 - Prepulsid (cisapride)
 - La rifampine
 - La rifabutine

Puis-je consommer alcool ou drogues de la rue durant mon traitement avec le saquinavir?

- Il est prudent d'éviter la consommation excessive d'alcool et de drogues de la rue lorsque vous prenez du saquinavir. L'alcool peut entrer en interaction avec les médicaments que vous prenez et accroître le risque de dommages au foie. Ne sautez surtout pas une dose de votre médicament sous le prétexte de vouloir prendre un verre.
- Le saquinavir peut également entrer en interaction avec les drogues de la rue. Par conséquent, si vous faites usage de telles drogues, consultez votre médecin et votre pharmacien qui pourront vous conseiller sur les précautions nécessaires.



Puis-je prendre le saquinavir si je suis enceinte ou si j'allaite?

- Si vous êtes enceinte et si vous souhaitez prendre du saquinavir, consultez votre médecin.
- Étant donné que le VIH peut se transmettre par le lait maternel, il est recommandé aux femmes séropositives à l'égard du VIH de ne pas allaiter.

De quelles autres précautions devrais-je être conscient durant mon traitement par le saquinavir?

- Respectez les rendez-vous que votre médecin a prévus pour les analyses sanguines dans le cadre de son suivi régulier de vos fonctions hépatique et rénale, de votre taux sanguin de sucre (glycémie), ainsi que de vos taux de cholestérol et de triglycérides.
- Assurez-vous d'avoir sous la main une réserve constante de votre médicament.
- Le saquinavir ne détruit pas le VIH, ni n'est une cure pour le sida. Il ne prévient pas non plus la transmission du VIH. Par conséquent, n'oubliez pas de prendre les précautions qui s'imposent avant les contacts sexuels (utilisez des condoms en latex) ou l'injection de drogues (utilisez des seringues propres).

Déni de responsabilité : Le Réseau canadien d'info-traitements sida (CATIE) et Africains en partenariat contre le sida (APAA) fournissent, de bonne foi, des ressources d'information aux personnes vivant avec le VIH/sida qui, en collaboration avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou diffusés par CATIE et APAA ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils médicaux. Nous ne recommandons ni appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos clients à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos clients à consulter un professionnel ou une professionnelle de santé qualifiée avant de prendre toute décision d'ordre médical ou d'utiliser un traitement, quel qu'il soit.

Nous ne pouvons garantir l'exactitude ou l'intégralité des renseignements publiés ou diffusés par CATIE ou APAA, ni de ceux auxquels CATIE ou APAA permet l'accès. Toute personne mettant en application ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE, ni APAA, ni Santé Canada — ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles — n'assume aucune responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l'usage de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent document ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE ou APAA, ou auquel CATIE ou APAA permet l'accès, sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels de Santé Canada

Droit d'auteur: Cette information a été rendue possible grâce à une collaboration entre - Africains en partenariat contre le sida (APAA), Asian Community AIDS Services (ACAS) et le Réseau canadien d'info-traitements sida (CATIE). Le texte original a été développé par ACAS en 2001. Le texte a été traduit en 2004 par APAA en swahili et haoussa

Cette information est aussi disponible en chinois, en tagalog et en vietnamien

Financé par le Programme des soins Santé Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le VIH/sida



ACAS
Asian Community AIDS Services
www.acas.org

Financé grâce à une subvention éducative sans restrictions de



partenaire
in partnership with

